

บุคลิกภาพของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดติดตามการรับรู้ของพยาบาล และความคาดหวัง
ของผู้บริหารและผู้ป่วย ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้

อัญชลี เจตวรานนท์	พย.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
รุชตะ เจ๊ะเต็ง	พย.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อาอี๊ะ บาหะ	พย.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดติดตามการรับรู้ของพยาบาล 2) ศึกษา ระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามความคาดหวังผู้บริหาร และ 3) ศึกษา ระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามความคาดหวังของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดจำนวน 80 คน 2) ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรพยาบาลจำนวน 80 คน และ 3) ผู้ป่วยที่ติดยาหรือสารเสพติดจำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไป และ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้บุคลิกภาพของพยาบาลข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามของกฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae) ในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ และแบบสอบถามที่พัฒนามาจากแบบสอบถามของกฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae) ในกลุ่มผู้บังคับบัญชา และกลุ่มผู้ป่วย มีการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของ ครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ 0.808 กลุ่มผู้บังคับบัญชา เท่ากับ 0.768 และกลุ่มผู้ป่วย เท่ากับ 0.784 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดติดตามการรับรู้ของพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.68$) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.65$) รองลงมาบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก ($\bar{X} = 3.44$) ส่วนบุคลิกภาพแบบห้วนไหว มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X} = 2.51$)

ระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามความคาดหวังของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.09$) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.85$) รองลงมาบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก ($\bar{X} = 3.76$) ส่วนบุคลิกภาพแบบห้วนไหว มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X} = 2.44$)

ระดับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดติดตามความคาดหวังของผู้ป่วยยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.89$) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ($\bar{X} = 3.13$) รองลงมาบุคลิกภาพแบบประนีประนอม ($\bar{X} = 3.11$) ส่วนบุคลิกภาพแบบห้วนไหว มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X} = 2.92$)

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลบุคลิกภาพของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่สอดคล้องกับการรับรู้ของพยาบาล และ ความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ป่วย และโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยในการพัฒนาบุคลิกภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้บริหารนำไปวางแผนในการพัฒนาบุคลิกภาพของพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการรับรู้ของพยาบาล และความคาดหวังของผู้บริหารและผู้ป่วยต่อไป