

ชื่อเรื่องการวิจัย ผลของ โปรแกรม	Younger member group ที่มีต่อความตั้งใจในการ บำบัดรักษาเยาเสพติระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST MODEL)
ผู้วิจัย	ยวารีหัยะ มะแซ และคณะ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติคกรมราชชนนี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ	กันยายน 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม Younger member group ที่มีต่อความตั้งใจในการบำบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST MODEL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ติดยาเสพติที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในในระยะ 7 วันแรกของการฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2555 จำนวน 61 คน โดยมีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุดคือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามระดับความตั้งใจในการบำบัดรักษา แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อโปรแกรม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผนการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม Younger member group ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVD) 0.78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม Younger member group โดยใช้สถิติทดสอบ Paired t-test

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของ ความตั้งใจในการบำบัดรักษาหลังเข้าร่วมโปรแกรม Younger member group พบว่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (\bar{X} ก่อน=3.59, \bar{X} หลัง = 3.99) ค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้ผลกระทบหลังเข้าร่วมโปรแกรม Younger member group พบว่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (\bar{X} ก่อน = 4.36 , \bar{X} หลัง = 4.40) ค่าเฉลี่ยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมหลังเข้าร่วมโปรแกรม Younger member group พบว่าเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (\bar{X} ก่อน = 3.64 , \bar{X} หลัง = 3.79) ค่าเฉลี่ยด้านความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรม Younger member group พบว่าอยู่ในระดับมาก (\bar{X} = 3.94) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ

ความตั้งใจในการบำบัดรักษาก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม Younger member group พบว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบและแรงสนับสนุนทางสังคม และพบค่าเฉลี่ยของความตั้งใจในการบำบัดรักษามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นหลังเข้าร่วมโปรแกรม Younger member group

ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้ผลกระทบ แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อความตั้งใจในการบำบัดรักษา จึงควรดำเนินกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยได้รับรู้ถึงผลกระทบของการใช้ยาเสพติดและเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจในการบำบัดรักษาและบำบัดรักษานครบกำหนด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

- Thesis title :** Results of the Younger Member Group program for intention in treating drug addicts at the stage of rehabilitation through Fast Model
- Authors :** Yawareeyah Masae et al, Thanyarak hospital Pattani, Institution for treating and rehabilitating drug addicts Baromarajonani, Department of Medical Services, Ministry of public health
- Academic year :** September, 2012

Abstract

The purpose of this experimental research is to study the results of the Younger Member Group program for intention in treating drug addicts at the stage of rehabilitation through Fast Model. The representative sample used in the research was 61 drug addicts treated as inpatients in the first seven days of the rehabilitation at Thanyarak hospital Pattani from July to August 2012 through the purposive sampling. Here are two research tools used in the research 1) tool for collection of data, questionnaires of intention level in treating and questionnaires of opinion level for the Younger Member Group program 2) tool used in the experiment was a lesson plan according to the Younger Member Group program. The content validity was verified by three experts. The content validity index (CVI) aggregates 0.78 The use of percentage, mean, standard deviation and inference statistics in descriptive statistics was for drawing a comparison between grade point index in the representative sample before and after the use of Younger Member Group program through Paired T-test.

The research result found that mean of intention in treating following the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts) increased in a great level (\bar{X} prior to the Younger Member Group program = 3.59, \bar{X} following the Younger Member Group program = 3.99), that mean of effect perception following the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts) increased in a great level (\bar{X} prior to the Younger Member Group program = 4.36, \bar{X}

following the Younger Member Group program = 4.40), that mean of social supports following the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts) increased in a great level (\bar{X} prior to the Younger Member Group program = 3.64, \bar{X} following the Younger Member Group program = 3.79), that mean of opinions on the Younger Member Group program laid in a great level (\bar{X} = 3.94). Considering the relation between intention in treating before and after the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts), we found that it bore relation to effect perception and social supports and we also found that mean of intention in treating had relation to opinions following the Younger Member Group program (participated by 61 drug addicts). The research result shows that intention in treating was highly influenced by effect perception and social supports. As a result, it is advisable that activities which cause awareness to patients in order to realize effects of drug abuse and which reinforce social supports for drug addicts be held in a row for the purpose of increasing patients' intention in treating until the due date and better quality of life hereafter.